তৃতীয় অধ্যায়
বীজগাণিতিক রাশি
(Algebraic Expressions)

বীজগণিতে অনেক সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক বীজগাণিতিক রাশি বিশ্লেষণ করে উৎপাদকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তাই এ অধ্যায়ে বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সমস্যা সমাধান এবং রাশিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ বিষয়ক বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী উপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু নানাবিধ গাণিতিক সমস্যা বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেও সমাধান করা যায়। পূর্বের শ্রেণিতে বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ও এদের সাথে সম্পৃক্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ঐগুলো পুনরুল্লেখ করা হলো এবং উদাহরণের মাধ্যমে এদের কতিপয় প্রয়োগ দেখানো হলো। এছাড়াও এ অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনের সম্প্রসারণ, ভাগশেষ উপপাদ্য প্রয়োগ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্রের গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- বীজগাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে বর্গ ও ঘনের সম্প্রসারণ করতে পারবে।
- ভাগশেষ উপপাদ্য কী ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং তা প্রয়োগ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বীজগাণিতিক সূত্র গঠন করতে পারবে এবং সূত্র প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

৩.১ বীজগাণিতিক রাশি

প্রক্রিয়া চিহ্ন এবং সংখ্যানির্দেশক অক্ষর প্রতীক এর অর্থবোধক বিন্যাসকে বীজগাণিতিক রাশি বলা হয়। যেমন, $2a+3b-4c$ একটি বীজগাণিতিক রাশি। বীজগাণিতিক রাশিতে $a, b, c, p, q, r, m, n, x, y, z, ...$ ইত্যাদি বর্ণমালার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়। বীজগাণিতিক রাশি সংবলিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই সমস্ত বর্ণমালাকে ব্যবহার করা হয়। পাটিগণিতে শুধু ধনাত্মক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়; অন্যদিকে বীজগণিতে শূন্যসহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সকল সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বীজগণিতকে পাটিগণিতের সর্বায়নকৃত রূপ বলা হয়। বীজগাণিতিক রাশিতে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলো ধ্রুবক *(constant)*, এদের মান নির্দিষ্ট।

বীজগাণিতিক রাশিতে ব্যবহৃত অক্ষর প্রতীকগুলো চলক *(variables)*, এদের মান নির্দিষ্ট নয়, এরা বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে।

৩.২ বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

বীজগাণিতিক প্রতীক দ্বারা প্রকাশিত যেকোনো সাধারণ নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে বীজগাণিতিক সূত্র বলা হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ও এতদসংক্রান্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ঐগুলো পুনরুল্লেখ করে কতিপয় প্রয়োগ দেখানো হলো।

সূত্র ১। $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

সূত্র ২। $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

মন্তব্য : সূত্র ১ ও সূত্র ২ হতে দেখা যায় যে, a^2+b^2 এর সাথে $2ab$ অথবা $-2ab$ যোগ করলে একটি পূর্ণবর্গ, অর্থাৎ $(a+b)^2$ অথবা $(a-b)^2$ পাওয়া যায়। সূত্র ১ এ b এর স্থলে $-b$ বসালে সূত্র ২ পাওয়া যায় :

$$\{a+(-b)\}^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2$$

অর্থাৎ, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

অনুসিদ্ধান্ত ১। $a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ২। $a^2+b^2 = (a-b)^2 + 2ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৩। $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$

প্রমাণ : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$= a^2 - 2ab + b^2 + 4ab$

$= (a-b)^2 + 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৪। $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

প্রমাণ : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$= a^2 + 2ab + b^2 - 4ab$

$= (a+b)^2 - 4ab$

অনুসিদ্ধান্ত ৫। $a^2 + b^2 = \dfrac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2}$

প্রমাণ : সূত্র ১ ও সূত্র ২ হতে,

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

যোগ করে, $2a^2 + 2b^2 = (a+b)^2 + (a-b)^2$

বা, $2(a^2+b^2) = (a+b)^2 + (a-b)^2$

সুতরাং, $(a^2+b^2) = \dfrac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2}$

অনুসিদ্ধান্ত ৬। $ab = \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\dfrac{a-b}{2}\right)^2$

প্রমাণ : সূত্র ১ ও সূত্র ২ হতে,

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

বিয়োগ করে, $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2$

বা, $ab = \frac{(a+b)^2}{4} - \frac{(a-b)^2}{4}$

সুতরাং, $ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

মন্তব্য : অনুসিদ্ধান্ত ৬ প্রয়োগ করে যেকোনো দুইটি রাশির গুণফলকে দুইটি রাশির বর্গের বিয়োগফল বা অন্তর রূপে প্রকাশ করা যায়।

সূত্র ৩। $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

অর্থাৎ, দুইটি রাশির বর্গের বিয়োগফল = রাশি দুইটির যোগফল × রাশি দুইটির বিয়োগফল

সূত্র ৪। $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)\,x + ab$

অর্থাৎ, $(x+a)(x+b) = x^2 + (a$ ও b এর বীজগাণিতিক যোগফল$)\ x + (a$ ও b এর গুণফল$)$

বর্গসূত্রের সম্প্রসারণ :

$a+b+c$ রাশিটিতে তিনটি পদ আছে। একে $(a+b)$ এবং c এ দুইটি পদের সমষ্টিরূপে বিবেচনা করা যায়। অতএব, সূত্র ১ প্রয়োগ করে $a+b+c$ রাশিটির বর্গ করে পাই,

$$(a+b+c)^2 = \{(a+b)+c\}^2$$
$$= (a+b)^2 + 2(a+b)c + c^2$$
$$= a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2$$
$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac.$$

সূত্র ৫। $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac.$

অনুসিদ্ধান্ত ৭। $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ac)$

অনুসিদ্ধান্ত ৮। $2(ab+bc+ac) = (a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)$

লক্ষ করি : সূত্র ৫ প্রয়োগ করে পাই,

(*i*) $(a+b-c)^2 = \{a+b+(-c)\}^2$
$$= a^2 + b^2 + (-c)^2 + 2ab + 2b(-c) + 2a(-c)$$
$$= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ac$$

(*ii*) $(a-b+c)^2 = \{a+(-b)+c\}^2$
$$= a^2 + (-b)^2 + c^2 + 2a(-b) + 2(-b)c + 2ac$$
$$= a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ac$$

(iii) $(a-b-c)^2 = \{a+(-b)+(-c)\}^2$

$= a^2+(-b)^2+(-c)^2+2a(-b)+2(-b)(-c)+2a(-c)$

$= a^2+b^2+c^2-2ab+2bc-2ac$

উদাহরণ ১। $(4x+5y)$ এর বর্গ কত ?

সমাধান : $(4x+5y)^2 = (4x)^2+2\times(4x)\times(5y)+(5y)^2$

$= 16x^2+40xy+25y^2$

উদাহরণ ২। $(3a-7b)$ এর বর্গ কত ?

সমাধান : $(3a-7b)^2 = (3a)^2-2\times(3a)\times(7b)+(7b)^2$

$= 9a^2-42ab+49b^2$

উদাহরণ ৩। বর্গের সূত্র প্রয়োগ করে 996 এর বর্গ নির্ণয় কর।

সমাধান : $(996)^2 = (1000-4)^2$

$= (1000)^2-2\times1000\times4+(4)^2$

$= 1000000-8000+16 = 1000016-8000$

$= 992016$

উদাহরণ ৪। $a+b+c+d$ এর বর্গ কত ?

সমাধান : $(a+b+c+d)^2 = \{(a+b)+(c+d)\}^2$

$= (a+b)^2+2(a+b)(c+d)+(c+d)^2$

$= a^2+2ab+b^2+2(ac+ad+bc+bd)+c^2+2cd+d^2$

$= a^2+2ab+b^2+2ac+2ad+2bc+2bd+c^2+2cd+d^2$

$= a^2+b^2+c^2+d^2+2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় কর :

১। $3xy+2ax$ ২। $4x-3y$ ৩। $x-5y+2z$

উদাহরণ ৫। সরল কর : $(5x+7y+3z)^2+2(7x-7y-3z)(5x+7y+3z)+(7x-7y-3z)^2$

সমাধান : ধরি, $5x+7y+3z = a$ এবং $7x-7y-3z = b$

$\therefore$ প্রদত্ত রাশি $= a^2+2.b.a+b^2$

$= a^2+2ab+b^2$

$= (a+b)^2$

$= \{(5x+7y+3z)+(7x-7y-3z)\}^2$ [a ও b এর মান বসিয়ে]

$= (5x+7y+3z+7x-7y-3z)^2$

$= (12x)^2$

$= 144x^2$

উদাহরণ ৬। $x-y=2$ এবং $xy=24$ হলে, $x+y$ এর মান কত ?

সমাধান : $(x+y)^2=(x-y)^2+4xy=(2)^2+4\times24=4+96=100$

$\therefore\quad x+y=\pm\sqrt{100}=\pm10$

উদাহরণ ৭। যদি $a^4+a^2b^2+b^4=3$ এবং $a^2+ab+b^2=3$ হয়, তবে a^2+b^2 এর মান কত ?

সমাধান : $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2)^2+2a^2b^2+(b^2)^2-a^2b^2$

$=(a^2+b^2)^2-(ab)^2$

$=(a^2+b^2+ab)(a^2+b^2-ab)$

$=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

$\therefore\quad 3=3(a^2-ab+b^2)$ [মান বসিয়ে]

বা, $a^2-ab+b^2=\frac{3}{3}=1$

এখন, $a^2+ab+b^2=3$ এবং $a^2-ab+b^2=1$ যোগ করে পাই, $2(a^2+b^2)=4$

বা, $a^2+b^2=\frac{4}{2}=2$

$\therefore\quad a^2+b^2=2$

উদাহরণ ৮। প্রমাণ কর যে, $(a+b)^4-(a-b)^4=8ab(a^2+b^2)$

সমাধান : $(a+b)^4-(a-b)^4=\{(a+b)^2\}^2-\{(a-b)^2\}^2$

$=\{(a+b)^2+(a-b)^2\}\{(a+b)^2-(a-b)^2\}$

$=2(a^2+b^2)\times4ab$ [$\because (a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)$ এবং $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$]

$=8ab(a^2+b^2)$

$\therefore\quad (a+b)^4-(a-b)^4=8ab(a^2+b^2)$

উদাহরণ ৯। $a+b+c=15$ এবং $a^2+b^2+c^2=83$ হলে, $ab+bc+ac$ এর মান কত ?

সমাধান : এখানে, $2(ab+bc+ac)$

$=(a+b+c)^2-(a^2+b^2+c^2)$

$=(15)^2-83$

$=225-83$

$=142$

$\therefore\quad ab+bc+ac=\frac{142}{2}=71$

বিকল্প পদ্ধতি :

আমরা জানি,

$(a+b+c)^2=(a^2+b^2+c^2)+2(ab+bc+ac)$

বা, $(15)^2=83+2(ab+bc+ac)$

বা, $225-83=2(ab+bc+ac)$

বা, $2(ab+bc+ac)=142$

$\therefore\quad ab+bc+ac=\frac{142}{2}=71$

উদাহরণ ১০। $a+b+c=2$ এবং $ab+bc+ac=1$ হলে, $(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2$ এর মান কত ?

সমাধান : $(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2$

$= a^2+2ab+b^2+b^2+2bc+c^2+c^2+2ca+a^2$

$= (a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca)+(a^2+b^2+c^2)$

$= (a+b+c)^2+\{(a+b+c)^2-2(ab+bc+ac)\}$

$= (2)^2+(2)^2-2\times1$

$= 4+4-2=8-2=6$

উদাহরণ ১১। $(2x+3y)(4x-5y)$ কে দুইটি বর্গের বিয়োগফলরূপে প্রকাশ কর।

সমাধান : ধরি, $2x+3y=a$ এবং $4x-5y=b$

$\therefore$ প্রদত্ত রাশি $= ab=\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-\left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$=\left(\frac{2x+3y+4x-5y}{2}\right)^2-\left(\frac{2x+3y-4x+5y}{2}\right)^2$ [a ও b এর মান বসিয়ে]

$=\left(\frac{6x-2y}{2}\right)^2-\left(\frac{8y-2x}{2}\right)^2$

$=\left(\frac{2(3x-y)}{2}\right)^2-\left(\frac{2(4y-x)}{2}\right)^2$

$= (3x-y)^2-(4y-x)^2$

$\therefore\ (2x+3y)(4x-5y)=(3x-y)^2-(4y-x)^2$

কাজ : ১। সরল কর : $(4x+3y)^2+2(4x+3y)(4x-3y)+(4x-3y)^2$

২। $x+y+z=12$ এবং $x^2+y^2+z^2=50$ হলে, $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

অনুশীলনী ৩·১

১। সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় কর :

(ক) $2a+3b$ (খ) $x^2+\frac{2}{y^2}$ (গ) $4y-5x$ (ঘ) $5x^2-y$

(ঙ) $3b-5c-2a$ (চ) $ax-by-cz$ (ছ) $2a+3x-2y-5z$ (জ) 1007

২। সরল কর :

(ক) $(7p+3r-5x)^2-2(7p+3r-5x)(8p-4r-5x)+(8p-4r-5x)^2$

(খ) $(2m+3n-p)^2+(2m-3n+p)^2-2(2m+3n-p)(2m-3n+p)$

(গ) $6\cdot35\times6\cdot35+2\times6\cdot35\times3\cdot65+3\cdot65\times3\cdot65$

(ঘ) $\frac{2345\times2345-759\times759}{2345-759}$

৩। $a-b=4$ এবং $ab=60$ হলে, $a+b$ এর মান কত ?

৪। $a+b=9m$ এবং $ab=18m^2$ হলে, $a-b$ এর মান কত ?

৫। $x-\frac{1}{x}=4$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x^4+\frac{1}{x^4}=322$.

৬। $2x+\frac{2}{x}=3$ হলে, $x^2+\frac{1}{x^2}$ এর মান কত ?

৭। $a+\frac{1}{a}=2$ হলে, দেখাও যে, $a^2+\frac{1}{a^2}=a^4+\frac{1}{a^4}$.

৮। $a+b=\sqrt{7}$ এবং $a-b=\sqrt{5}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $8ab(a^2+b^2)=24$

৯। $a+b+c=9$ এবং $ab+bc+ca=31$ হলে, $a^2+b^2+c^2$ এর মান নির্ণয় কর।

১০। $a^2+b^2+c^2=9$ এবং $ab+bc+ca=8$ হলে, $(a+b+c)^2$ এর মান কত ?

১১। $a+b+c=6$ এবং $a^2+b^2+c^2=14$ হলে, $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

১২। $x=3, y=4$ এবং $z=5$ হলে, $9x^2+16y^2+4z^2-24xy-16yz+12zx$ এর মান নির্ণয় কর।

১৩। $(a+2b)(3a+2c)$ কে দুইটি বর্গের বিয়োগফলরূপে প্রকাশ কর।

১৪। $x^2+10x+24$ কে দুইটি বর্গের বিয়োগফলরূপে প্রকাশ কর।

১৫। $a^4+a^2b^2+b^4=8$ এবং $a^2+ab+b^2=4$ হলে, (i) a^2+b^2, (ii) ab-এর মান নির্ণয় কর।

৩·৩ ঘন সংবলিত সূত্রাবলি

সূত্র ৬। $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$$=a^3+b^3+3ab(a+b)$$

প্রমাণ : $(a+b)^3=(a+b)(a+b)^2$

$$=(a+b)(a^2+2ab+b^2)$$
$$=a(a^2+2ab+b^2)+b(a^2+2ab+b^2)$$
$$=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3$$
$$=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$
$$=a^3+b^3+3ab(a+b)$$

অনুসিদ্ধান্ত ৯। $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

সূত্র ৭। $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

$$=a^3-b^3-3ab(a-b)$$

প্রমাণ : $(a-b)^3=(a-b)(a-b)^2$

$$= (a-b)(a^2-2ab+b^2)$$
$$= a(a^2-2ab+b^2)-b(a^2-2ab+b^2)$$
$$= a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3$$
$$= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$
$$= a^3-b^3-3ab(a-b)$$

লক্ষ করি : সূত্র ৬ এ b এর স্থলে $-b$ বসালে সূত্র ৭ পাওয়া যায় :

$$\{a+(-b)\}^3 = a^3+(-b)^3+3a(-b)\{a+(-b)\}$$

অর্থাৎ, $(a-b)^3 = a^3-b^3-3ab(a-b)$

অনুসিদ্ধান্ত ১০। $a^3-b^3 = (a-b)^3+3ab(a-b)$

সূত্র ৮। $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$

প্রমাণ : $a^3+b^3 = (a+b)^3-3ab(a+b)$
$$= (a+b)\{(a+b)^2-3ab\}$$
$$= (a+b)(a^2+2ab+b^2-3ab)$$
$$= (a+b)(a^2-ab+b^2)$$

সূত্র ৯। $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$

প্রমাণ : $a^3-b^3 = (a-b)^3+3ab(a-b)$
$$= (a-b)\{(a-b)^2+3ab\}$$
$$= (a-b)(a^2-2ab+b^2+3ab)$$
$$= (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

উদাহরণ ১২। $2x+3y$ এর ঘন নির্ণয় কর।

সমাধান : $(2x+3y)^3 = (2x)^3+3(2x)^2\cdot 3y+3\cdot 2x(3y)^2+(3y)^3$
$$= 8x^3+3\cdot 4x^2\cdot 3y+3\cdot 2x\cdot 9y^2+27y^3$$
$$= 8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$$

উদাহরণ ১৩। $2x-y$ এর ঘন নির্ণয় কর।

সমাধান : $(2x-y)^3 = (2x)^3-3\cdot(2x)^2y+3\cdot 2x\cdot y^2-y^3$
$$= 8x^3-3\cdot 4x^2y+6xy^2-y^3$$
$$= 8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3$$

কাজ : সূত্রের সাহায্যে ঘন নির্ণয় কর :
১। $3x+2y$ ২। $3x-4y$ ৩। 397

উদাহরণ ১৪। $x=37$ হলে, $8x^3+72x^2+216x+216$ এর মান কত ?

সমাধান : $8x^3+72x^2+216x+216$

$= (2x)^3+3\cdot(2x)^2\cdot 6+3\cdot 2x.(6)^2+(6)^3$

$= (2x+6)^3$

$= (2\times 37+6)^3$ [মান বসিয়ে]

$= (74+6)^3$

$= (80)^3$

$= 512000$

উদাহরণ ১৫। যদি $x-y=8$ এবং $xy=5$ হয়, তবে $x^3-y^3+8(x+y)^2$ এর মান কত ?

সমাধান : $x^3-y^3+8(x+y)^2$

$= (x-y)^3+3xy(x-y)+8\{(x-y)^2+4xy\}$

$= (8)^3+3\times 5\times 8+8(8^2+4\times 5)$ [মান বসিয়ে]

$= 8^3+15\times 8+8(64+20)$

$= 8^3+15\times 8+8\times 84$

$= 8(8^2+15+84)$

$= 8(64+15+84)$

$= 8\times 163$

$= 1304$

উদাহরণ ১৬। যদি $a=\sqrt{3}+\sqrt{2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $a^3+\frac{1}{a^3}=18\sqrt{3}.$

সমাধান : দেওয়া আছে, $a=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

$\therefore \quad \frac{1}{a}=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

$= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ [লব ও হরকে $(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ দ্বারা গুণ করে]

$= \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3-2}$

$= \sqrt{3}-\sqrt{2}$

$\therefore \quad a+\frac{1}{a}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})$

$= \sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{2}=2\sqrt{3}$

এখন, $a^3+\frac{1}{a^3}=\left(a+\frac{1}{a}\right)^3-3\cdot a\cdot\frac{1}{a}\left(a+\frac{1}{a}\right)$

$= (2\sqrt{3})^3-3(2\sqrt{3})$ $[\because a+\frac{1}{a}=2\sqrt{3}]$

$= 2^3 \cdot \left(\sqrt{3}\right)^3 - 3\times 2\sqrt{3}$

$= 8\cdot 3\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$

$= 24\sqrt{3} - 6\sqrt{3}$

$= 18\sqrt{3}$ (প্রমাণিত)

উদাহরণ ১৭। $x+y = 5$, $xy = 6$ এবং $x > y$ হলে,

ক) $2(x^2+y^2)$ এর মান নির্ণয় কর

খ) $x^3-y^3-3(x^2+y^2)$ এর মান নির্ণয় কর ।

গ) x^5+y^5এর মান নির্ণয় কর ।

সমাধান :

(ক) আমরা জানি,

$$2\left(x^2+y^2\right) = 2\left\{(x+y)^2 - 2xy\right\}$$
$$= 2\left(5^2 - 2.6\right)$$
$$= 2\times 13$$
$$= 26$$
$$\therefore 2\left(x^2+y^2\right) = 26$$

(খ) দেওয়া আছে, $x + y = 5$ এবং $xy = 6$, $x > y$

$$\therefore x - y = \sqrt{(x+y)^2 - 4xy}$$
$$= \sqrt{5^2 - 4.6}$$
$$= \sqrt{25-24} = 1$$
$$\therefore x - y = 1$$
$$x^3 - y^3 - 3\left(x^2+y^2\right) = (x-y)^3 + 3xy(x-y) - \frac{3}{2}.2\left(x^2+y^2\right)$$
$$= (1)^3 + 3.6.1 - \frac{3}{2}.26$$
$$= 1 + 18 - 3.13$$
$$= 19 - 39$$
$$\therefore x^3 - y^3 - 3\left(x^2+y^2\right) = -20$$

(গ) $x^5 + y^5$

দেওয়া আছে, $x + y = 5$

$\therefore x - y = 1$

'+' করে $2x = 6$

$\therefore x = \frac{6}{2} = 3$

আবার,

$x + y = 5$

$\therefore x - y = 1$

'–' করে $2y = 4$

$\therefore y = \frac{4}{2} = 2$

$\therefore x^5 + y^5 = 3^5 + 2^5$
$= 243 + 32$
$= 275$

কাজ : ১। $x = -2$ হলে, $27x^3 - 54x^2 + 36x - 8$ এর মান কত ?

২। $a + b = 5$ এবং $ab = 6$ হলে, $a^3 + b^3 + 4(a-b)^2$ এর মান নির্ণয় কর।

৩। $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

অনুশীলনী ৩·২

১। সূত্রের সাহায্যে ঘন নির্ণয় কর :

(ক) $2x^2 + 3y^2$ (খ) $7m^2 - 2n$ (গ) $2a - b - 3c$

২। সরল কর :

(ক) $(7x+3b)^3 - (5x+3b)^3 - 6x(7x+3b)(5x+3b)$

(খ) $(a+b+c)^3 - (a-b-c)^3 - 6(b+c)\{a^2 - (b+c)^2\}$

(গ) $(m+n)^6 - (m-n)^6 - 12mn(m^2 - n^2)^2$

(ঘ) $(x+y)(x^2 - xy + y^2) + (y+z)(y^2 - yz + z^2) + (z+x)(z^2 - zx + x^2)$

(ঙ) $(2x+3y-4z)^3 + (2x-3y+4z)^3 + 12x\{4x^2 - (3y-4z)^2\}$

৩। $a - b = 5$ এবং $ab = 36$ হলে, $a^3 - b^3$ এর মান কত ?

৪। যদি $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হয়, তবে ab এর মান কত ?

৫। $x = 19$ এবং $y = -12$ হলে, $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$ এর মান নির্ণয় কর।

৬। যদি $a = 15$ হয়, তবে $8a^3 + 60a^2 + 150a + 130$ এর মান কত ?

৭। যদি $a + b = m, a^2 + b^2 = n$ এবং $a^3 + b^3 = p^3$ হয়, তবে দেখাও যে, $m^3 + 2p^3 = 3mn$.

৮। $a + b = 3$ এবং $ab = 2$ হলে, (ক) $a^2 - ab + b^2$ এবং (খ) $a^3 + b^3$ এর মান নির্ণয় কর।

৯। $a - b = 5$ এবং $ab = 36$ হলে, (ক) $a^2 + ab + b^2$ এবং (খ) $a^3 - b^3$ এর মান নির্ণয় কর।

১০। $m + \frac{1}{m} = a$ হলে, $m^3 + \frac{1}{m^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

১১। $x - \frac{1}{x} = p$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

১২। যদি $a - \frac{1}{a} = 1$ হয়, তবে দেখাও যে, $a^3 - \frac{1}{a^3} = 4$.

১৩। যদি $a+b+c=0$ হয়, তবে দেখাও যে,

(ক) $a^3+b^3+c^3=3abc$ (খ) $\frac{(b+c)^2}{3bc}+\frac{(c+a)^2}{3ca}+\frac{(a+b)^2}{3ab}=1$

১৪। $p-q=r$ হলে, দেখাও যে, $p^3-q^3-r^3=3pqr$

১৫। $2x-\frac{2}{x}=3$ হলে, দেখাও যে, $8\left(x^3-\frac{1}{x^3}\right)=63$

১৬। $a=\sqrt{6}+\sqrt{5}$ হলে, $\frac{a^6-1}{a^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৭। $x-\frac{1}{x}=\sqrt{3}$ যেখানে $x\neq 0$

ক) প্রমাণ কর যে, $x^2-\sqrt{3}x=1$

খ) প্রমাণ কর যে, $23\ (x^2+\frac{1}{x^2})=5\ (x^4+\frac{1}{x^4})$

গ) $(x^6+\frac{1}{x^6})$ এর মান নির্ণয় কর ।

৩.৪ উৎপাদকে বিশ্লেষণ

কোনো রাশি দুই বা ততোধিক রাশির গুণফলের সমান হলে, শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথমোক্ত রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলা হয়।

কোনো বীজগাণিতিক রাশির সম্ভাব্য উৎপাদকগুলো নির্ণয় করার পর রাশিটিকে লব্ধ উৎপাদকগুলোর গুণফলরূপে প্রকাশ করাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ বলা হয়।

বীজগাণিতিক রাশিগুলো এক বা একাধিক পদবিশিষ্ট হতে পারে। সেজন্য উক্ত রাশির উৎপাদকগুলোও এক বা একাধিক পদবিশিষ্ট হতে পারে।

উৎপাদক নির্ণয়ের কতিপয় কৌশল :

(ক) কোনো বহুপদীর প্রত্যেক পদে সাধারণ উৎপাদক থাকলে তা প্রথমে বের করে নিতে হয়। যেমন :

(*i*) $3a^2b+6ab^2+12a^2b^2=3ab(a+2b+4ab)$

(*ii*) $2ab(x-y)+2bc(x-y)+3ca(x-y)=(x-y)(2ab+2bc+3ca)$

(খ) একটি রাশিকে পূর্ণ বর্গ আকারে প্রকাশ করে :

উদাহরণ ১। $4x^2+12x+9$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $4x^2+12x+9=(2x)^2+2\times 2x\times 3+(3)^2$

$=(2x+3)^2=(2x+3)(2x+3)$

উদাহরণ ২। $9x^2 - 30xy + 25y^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $9x^2 - 30xy + 25y^2$

$= (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5y + (5y)^2$

$= (3x - 5y)^2 = (3x - 5y)(3x - 5y)$

(গ) একটি রাশিকে দুইটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করে এবং $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ সূত্র প্রয়োগ করে :

উদাহরণ ৩। $a^2 - 1 + 2b - b^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $a^2 - 1 + 2b - b^2 = a^2 - (b^2 - 2b + 1)$

$= a^2 - (b-1)^2 = \{a + (b-1)\}\{a - (b-1)\}$

$= (a + b - 1)(a - b + 1)$

উদাহরণ ৪। $a^4 + 64b^4$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $a^4 + 64b^4 = (a^2)^2 + (8b^2)^2$

$= (a^2)^2 + 2 \times a^2 \times 8b^2 + (8b^2)^2 - 16a^2b^2$

$= (a^2 + 8b^2)^2 - (4ab)^2$

$= (a^2 + 8b^2 + 4ab)(a^2 + 8b^2 - 4ab)$

$= (a^2 + 4ab + 8b^2)(a^2 - 4ab + 8b^2)$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। $abx^2 + acx^3 + adx^4$ ২। $xa^2 - 144xb^2$ ৩। $x^2 - 2xy - 4y - 4$

(ঘ) $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$ **সূত্রটি ব্যবহার করে :**

উদাহরণ ৫। $x^2 + 12x + 35$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $x^2 + 12x + 35 = x^2 + (5+7)x + 5 \times 7$

$= (x+5)(x+7)$

এ পদ্ধতিতে $x^2 + px + q$ আকারের বহুপদীর উৎপাদক নির্ণয় করা সম্ভব হয় যদি দুইটি পূর্ণসংখ্যা a ও b নির্ণয় করা যায় যেন, $a + b = p$ এবং $ab = q$ হয়। এজন্য q এর দুইটি স্বচিহ্ন উৎপাদক নিতে হয় যাদের বীজগাণিতিক সমষ্টি p হয়। $q > 0$ হলে, a ও b একই চিহ্নযুক্ত হবে এবং $q < 0$ হলে, a ও b বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে।

উদাহরণ ৬। $x^2 + x - 20$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $x^2 + x - 20$

$= x^2 + (5-4)x + (5)(-4)$

$= (x+5)(x-4)$

(ঙ) ax^2+bx+c আকারের বহুপদীর মধ্যপদ বিভক্তিকরণ পদ্ধতিতে :

$ax^2+bx+c=(rx+p)(sx+q)$ হবে

যদি $ax^2+bx+c=rsx^2+x(rq+sp)x+pq$

অর্থাৎ, $a=rs, b=rq+sp$ এবং $c=pq$ হয়।

সুতরাং, $ac=rspq=(rq)(sp)$ এবং $b=rq+sp$

অতএব, ax^2+bx+c আকারের বহুপদীর উৎপাদক নির্ণয় করতে হলে ac, অর্থাৎ, x^2 এর সহগ এবং x বর্জিত পদের গুণফলকে এমন দুইটি উৎপাদকে প্রকাশ করতে হবে, যাদের বীজগাণিতিক সমষ্টি x এর সহগ b এর সমান হয়।

উদাহরণ ৭। $3x^2-x-14$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $3x^2-x-14=3x^2-7x+6x-14$

$=x(3x-7)+2(3x-7)$

$=(3x-7)(x+2)$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। x^2+x-56 ২। $16x^3-46x^2+15x$ ৩। $12x^2+17x+6$

(চ) একটি রাশিকে পূর্ণ ঘন আকারে প্রকাশ করে :

উদাহরণ ৮। $8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$

$=(2x)^3+3\times(2x)^2\times3y+3\times2x\times(3y)^2+(3y)^3$

$=(2x+3y)^3=(2x+3y)(2x+3y)(2x+3y)$

(ছ) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ এবং $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ সূত্র দুইটি ব্যবহার করে:

উদাহরণ ৯। উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : (*i*) $8a^3+27b^3$ (*ii*) a^6-64

সমাধান : (*i*) $8a^3+27b^3=(2a)^3+(3b)^3$

$=(2a+3b)\{(2a)^2-2a\times3b+(3b)^2\}$

$=(2a+3b)(4a^2-6ab+9b^2)$

(*ii*) $a^6-64=(a^2)^3-(4)^3$

$=(a^2-4)\{(a^2)^2+a^2\times4+(4)^2\}$

$=(a^2-4)(a^4+4a^2+16)$

কিন্তু $a^2-4=a^2-2^2=(a+2)(a-2)$

এবং $a^4+4a^2+16=(a^2)^2+(4)^2+4a^2$

$=(a^2+4)^2-2(a^2)(4)+4a^2$

$=(a^2+4)^2-4a^2$

$=(a^2+4)^2-(2a)^2$

বিকল্প নিয়ম :

$a^6-64=(a^3)^2-(8)^2$

$=(a^3+8)(a^3-8)$

$=(a^3+2^3)(a^3-2^3)$

$=(a+2)(a^2-2a+4)\times(a-2)(a^2+2a+4)$

$=(a+2)(a-2)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$

$= (a^2+4+2a)(a^2+4-2a)$

$= (a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$

$\therefore a^6-64$

$= (a+2)(a-2)(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। $2x^4+16x$ ২। $8-a^3+3a^2b-3ab^2+b^3$ ৩। $(a+b)^3+(a-b)^3$

(জ) ভগ্নাংশসহগযুক্ত রাশির উৎপাদক :

ভগ্নাংশযুক্ত রাশির উৎপাদকগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়।

যেমন, $a^3+\frac{1}{27}=a^3+\frac{1}{3^3}=\left(a+\frac{1}{3}\right)\left(a^2-\frac{a}{3}+\frac{1}{9}\right)$

আবার, $a^3+\frac{1}{27}=\frac{1}{27}(27a^3+1)=\frac{1}{27}\{(3a)^3+(1)^3\}$

$=\frac{1}{27}(3a+1)(9a^2-3a+1)$

এখানে, দ্বিতীয় সমাধানে চলক–সংবলিত উৎপাদকগুলোর সকল সহগ পূর্ণসংখ্যা। প্রথম ও দ্বিতীয় সমাধান অভিন্ন।

$\frac{1}{27}(3a+1)(9a^2-3a+1)$

$=\frac{1}{3}(3a+1)\times\frac{1}{9}(9a^2-3a+1)$

$=\left(a+\frac{1}{3}\right)\left(a^2-\frac{a}{3}+\frac{1}{9}\right)$

উদাহরণ ১০। $x^3+6x^2y+11xy^2+6y^3$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : $x^3+6x^2y+11xy^2+6y^3$

$=\{x^3+3\cdot x^2\cdot 2y+3\cdot x(2y)^2+(2y)^3\}-xy^2-2y^3$

$=(x+2y)^3-y^2(x+2y)$

$=(x+2y)\{(x+2y)^2-y^2\}$

$=(x+2y)(x+2y+y)(x+2y-y)$

$=(x+2y)(x+3y)(x+y)$

$=(x+y)(x+2y)(x+3y)$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। $\frac{1}{2}x^2+\frac{7}{6}x+\frac{1}{3}$ ২। $a^3+\frac{1}{8}$ ৩। $16x^2-25y^2-8xz+10yz$

অনুশীলনী ৩·৩

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর (১ – ৩০) :

১। $ab(x-y)-bc(x-y)$

২। $9x^2+24x+16$

৩। a^4-27a^2+1

৪। $x^4-6x^2y^2+y^4$

৫। $(a^2-b^2)(x^2-y^2)+4abxy$

৬। $4a^2-12ab+9b^2-4c^2$

৭। $a^2+6a+8-y^2+2y$

৮। $16x^2-25y^2-8xz+10yz$

৯। $2b^2c^2+2c^2a^2+2a^2b^2-a^4-b^4-c^4$

১০। $x^2+13x+36$

১১। x^4+x^2-20

১২। $a^2-30a+216$

১৩। a^8-a^4-2

১৪। $x^2-37x-650$

১৫। $9x^2y^2-5xy^2-14y^2$

১৬। $4x^4-27x^2-81$

১৭। $ax^2+(a^2+1)x+a$

১৮। $3(a^2+2a)^2-22(a^2+2a)+40$

১৯। $14(x+z)^2-29(x+z)(x+1)-15(x+1)^2$

২০। $(a-1)x^2+a^2xy+(a+1)y^2$

২১। x^3+3x^2+3x+2

২২। $a^3-6a^2+12a-9$

২৩। $a^3-9b^3+(a+b)^3$

২৪। $8x^3+12x^2+6x-63$

২৫। $8a^3+\frac{b^3}{27}$

২৬। $\frac{a^6}{27}-b^6$

২৭। $4a^2+\frac{1}{4a^2}-2+4a-\frac{1}{a}$

২৮। $(3a+1)^3-(2a-3)^3$

২৯। $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-48$

৩০। $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)-64$

৩১। দেখাও যে, $(x+1)(x+2)(3x-1)(3x-4)=(3x^2+2x-1)(3x^2+2x-8)$

৩.৫ ভাগশেষ উপপাদ্য *(Remainder Theorem)*

আমরা নিচের উদাহরণটি লক্ষ করি :

$6x^2-7x+5$ কে $x-1$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ও ভাগশেষ কত ?

$6x^2-7x+5$ কে $x-1$ দ্বারা সাধারণভাবে ভাগ করলে পাই,

$$\begin{array}{r|l} x-1 & 6x^2-7x+5 \;(\; 6x-1 \\ & \underline{-6x^2+6x} \\ & \quad -x+5 \\ & \quad \underline{-x+1} \\ & \qquad 4 \end{array}$$

এখানে, ভাজক $x-1$, ভাজ্য $6x^2-7x+5$, ভাগফল $6x-1$ এবং ভাগশেষ 4 ।

আমরা জানি, ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ

এখন যদি আমরা ভাজ্যকে $f(x)$, ভাগফলকে $h(x)$, ভাগশেষকে r ও ভাজককে $(x-a)$ দ্বারা সূচিত করি, তাহলে উপরের সূত্র থেকে পাই,

$f(x)=(x-a)\cdot h(x)+r$, এই সূত্রটি a এর সকল মানের জন্য সত্য।

উভয়পক্ষে $x=a$ বসিয়ে পাই,

$f(a)=(a-a)\cdot h(a)+r=0\cdot h(a)+r=r$

সুতরাং, $r=f(a)$

অতএব, $f(x)$ কে $(x-a)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় $f(a)$. এই প্রতিজ্ঞা ভাগশেষ উপপাদ্য *(Remainder theorem)* নামে পরিচিত। অর্থাৎ, ধনাত্মক মাত্রার কোনো বহুপদী $f(x)$ কে $(x-a)$ আকারের বহুপদী দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা ভাগ না করে বের করার সূত্রই হলো ভাগশেষ উপপাদ্য। উপরের উদাহরণে $a=1$ হলে $f(x)=6x^2-7x+5;\ \therefore f(1)=6-7+5=4$ যা ভাগফলের সমান। ভাজক বহুপদী $(x-a)$ এর মাত্রা 1, ভাজক যদি ভাজ্যের উৎপাদক হয়, তাহলে ভাগশেষ হবে শূন্য। আর যদি উৎপাদক না হয়, তাহলে ভাগশেষ থাকবে এবং তা হবে অশূন্য কোনো সংখ্যা।

প্রতিজ্ঞা : যদি $f(x)$ এর মাত্রা ধনাত্মক হয় এবং $a\neq 0$ হয়, তবে $f(x)$ কে $(ax+b)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় $f\left(-\frac{b}{a}\right)$.

প্রমাণ : ভাজক $ax+b$, $(a\neq 0)$ এর মাত্রা 1,

সুতরাং আমরা লিখতে পারি,

$$f(x)=(ax+b)\cdot h(x)+r=a\left(x+\frac{b}{a}\right)\cdot h(x)+r$$

$$\therefore\quad f(x)=\left(x+\frac{b}{a}\right)\cdot a\cdot h(x)+r$$

দেখা যাচ্ছে যে, $f(x)$ কে $\left(x+\frac{b}{a}\right)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয়, $a\cdot h(x)$ এবং ভাগশেষ হয় r.

এখানে, ভাজক = $x-\left(-\frac{b}{a}\right)$

সুতরাং ভাগশেষ উপপাদ্য অনুযায়ী, $r=f\left(-\frac{b}{a}\right)$

অতএব, $f(x)$ কে $(ax+b)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় $f\left(-\frac{b}{a}\right)$.

অনুসিদ্ধান্ত : $(x-a)$, $f(x)$ এর উৎপাদক হবে, যদি এবং কেবল যদি $f(a)=0$ হয়।

প্রমাণ : ধরি, $f(a)=0$
অতএব, ভাগশেষ উপপাদ্য অনুযায়ী, $f(x)$ কে $(x-a)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ শূন্য হবে। অর্থাৎ, $(x-a)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক হবে।
বিপরীতক্রমে, ধরি, $(x-a)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।
অতএব, $f(x)=(x-a)\cdot h(x)$, যেখানে $h(x)$ বহুপদী।
উভয়পক্ষে $x=a$ বসিয়ে পাই,
$f(a)=(a-a)\cdot h(a)=0$
$\therefore\ f(a)=0$.
সুতরাং, কোনো বহুপদী $f(x),(x-a)$ দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি এবং কেবল যদি $f(a)=0$ হয়। এই সূত্র উৎপাদক উপপাদ্য *(Factor theorem)* নামে পরিচিত।

অনুসিদ্ধান্ত : $ax+b,\ a\neq 0$ হলে, রাশিটি কোনো বহুপদী $f(x)$ এর উৎপাদক হবে, যদি এবং কেবল যদি $f\left(-\frac{b}{a}\right)=0$ হয়।

প্রমাণ : $a\neq 0, ax+b=a\left(x+\frac{b}{a}\right)$, $f(x)$ এর উৎপাদক হবে, যদি এবং কেবল যদি $\left(x+\frac{b}{a}\right)=x-\left(-\frac{b}{a}\right)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক হয়। অর্থাৎ, যদি এবং কেবল যদি $f\left(-\frac{b}{a}\right)=0$ হয়। ভাগশেষ উপপাদ্যের সাহায্যে উৎপাদক নির্ণয়ের এই পদ্ধতিকে শূন্যায়ন পদ্ধতিও *(Vanishing method)* বলে।

উদাহরণ ১। x^3-x-6 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।
সমাধান : এখানে, $f(x)=x^3-x-6$ একটি বহুপদী। এর ধ্রুবপদ -6 এর উৎপাদকগুলো হচ্ছে $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ এবং ± 6.
এখন, $x=1,-1$ বসিয়ে দেখি, $f(x)$ এর মান শূন্য হয় না।
কিন্তু $x=2$ বসিয়ে দেখি, $f(x)$ এর মান শূন্য হয়।
অর্থাৎ, $f(2)=2^3-2-6=8-2-6=0$.
সুতরাং, $x-2$, $f(x)$ বহুপদীটির একটি উৎপাদক।

$$\begin{aligned}\therefore\ f(x) &= x^3-x-6\\ &= x^3-2x^2+2x^2-4x+3x-6\\ &= x^2(x-2)+2x(x-2)+3(x-2)\\ &= (x-2)(x^2+2x+3)\end{aligned}$$

উদাহরণ ২। $x^3-3xy^2+2y^3$ এবং $x^2+xy-2y^2$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : এখানে, x কে চলক এবং y কে ধ্রুবক হিসেবে বিবেচনা করি।

প্রদত্ত রাশিকে x -এর বহুপদী বিবেচনা করে

ধরি, $f(x)=x^3-3xy^2+2y^3$

তাহলে, $f(y)=y^3-3y\cdot y^2+2y^3=3y^3-3y^3=0$

$\therefore$ $(x-y)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।

এখন, $x^3-3xy^2+2y^3$

$= x^3-x^2y+x^2y-xy^2-2xy^2+2y^3$

$= x^2(x-y)+xy(x-y)-2y^2(x-y)$

$= (x-y)(x^2+xy-2y^2)$

$= (x-y)(x^2+2xy-xy-2y^2)$

$= (x-y)\{x(x+2y)-y(x+2y)\}$

$= (x-y)(x+2y)(x-y)$

$= (x-y)^2(x+2y)$

আবার ধরি,

$g(x)=x^2+xy-2y^2$

$\therefore$ $g(y)=y^2+y^2-2y^2=0$

$\therefore (x-y)$, $g(x)$ এর একটি উৎপাদক

$\therefore$ $x^2+xy-2y^2$

$= x^2-xy+2xy-2y^2$

$= x(x-y)+2y(x-y)$

$= (x-y)(x+2y)$

$\therefore$ $x^3-3xy^2+2y^3=(x-y)^2(x+2y)$

উদাহরণ ৩। $54x^4+27x^3a-16x-8a$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

সমাধান : ধরি, $f(x)=54x^4+27x^3a-16x-8a$

তাহলে, $f\left(-\frac{1}{2}a\right)=54\left(-\frac{1}{2}a\right)^4+27a\left(-\frac{1}{2}a\right)^3-16\left(-\frac{1}{2}a\right)-8a$

$= \frac{27}{8}a^4-\frac{27}{8}a^4+8a-8a=0$

$\therefore$ $x-\left(-\frac{1}{2}a\right)=x+\frac{a}{2}=\frac{1}{2}(2x+a)$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক, অতএব $2x+a$, $f(x)$ এর একটি উৎপাদক।

এখন, $54x^4+27x^3a-16x-8a=27x^3(2x+a)-8(2x+a)=(2x+a)(27x^3-8)$

$=(2x+a)\{(3x)^3-(2)^3\}=(2x+a)(3x-2)(9x^2+6x+4)$

কাজ : উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। $x^3-21x-20$ ২। $2x^3-3x^2+3x-1$ ৩। $x^3+6x^2+11x+6$

অনুশীলনী ৩·৪

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর :

১। $3a^3+2a+5$ ২। $x^3-7xy^2-6y^3$

৩। x^3+2x^2-5x-6 ৪। x^3+4x^2+x-6

৫। $a^3+3a+36$ ৬। a^4-4a+3

৭। $a^3-a^2-10a-8$ ৮। x^3-3x^2+4x-4

৯। $a^3-7a^2b+7ab^2-b^3$ ১০। x^3-x-24

১১। $x^3+6x^2y+11xy^2+6y^3$ ১২। $2x^4-3x^3-3x-2$

১৩। $4x^4+12x^3+7x^2-3x-2$ ১৪। $x^6-x^5+x^4-x^3+x^2-x$

১৫। $4x^3-5x^2+5x-1$ ১৬। $18x^3+15x^2-x-2$

৩·৬ বাস্তব সমস্যা সমাধানে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন ও প্রয়োগ

দৈনন্দিন কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমরা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হই। এই সমস্যাগুলো ভাষাগতভাবে বর্ণিত হয়। এ অনুচ্ছেদে আমরা ভাষাগতভাবে বর্ণিত বাস্তব পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে বীজগাণিতিক সূত্র গঠন এবং তা প্রয়োগ করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন বাস্তব পরিবেশে গণিতের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা পাবে, অন্যদিকে নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় গণিতের সম্পৃক্ততা বুঝতে পেরে গণিত শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে।

সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি :

(ক) প্রথমেই সতর্কতার সাথে সমস্যাটি পর্যবেক্ষণ করে এবং মনোযোগ সহকারে পড়ে কোনগুলো অজ্ঞাত এবং কী নির্ণয় করতে হবে তা চিহ্নিত করতে হবে।

(খ) অজ্ঞাত রাশিগুলোর একটিকে যেকোনো চলক (ধরি x) দ্বারা সূচিত করতে হবে। অতঃপর সমস্যাটি ভালোভাবে অনুধাবন করে অন্যান্য অজ্ঞাত রাশিগুলোকেও একই চলক x এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

(গ) সমস্যাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে বীজগাণিতিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করতে হবে।

(ঘ) প্রদত্ত শর্ত ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে একত্রে একটি সমীকরণে প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) সমীকরণটি সমাধান করে অজ্ঞাত রাশি x এর মান নির্ণয় করতে হবে।

বাস্তব সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করা হয়। সূত্রগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

(১) **দেয় বা প্রাপ্য বিষয়ক :**

দেয় বা প্রাপ্য, $A=qn$ টাকা

যেখানে, q = জনপ্রতি দেয় বা প্রাপ্য টাকার পরিমাণ

n = লোকের সংখ্যা

(২) **সময় ও কাজ বিষয়ক :**

কয়েকজন লোক একটি কাজ সম্পন্ন করলে,

কাজের পরিমাণ, $W = qnx$

যেখানে, q = প্রত্যেকে একক সময়ে কাজের যে অংশ সম্পন্ন করে,

n = কাজ সম্পাদনকারীর সংখ্যা

x = কাজের মোট সময়

$W = n$ জনে x সময়ে কাজের যে অংশ সম্পন্ন করে

(৩) **সময় ও দূরত্ব বিষয়ক :**

নির্দিষ্ট সময়ে দূরত্ব, $d = vt$.

যেখানে, v = প্রতি ঘণ্টায় গতিবেগ

t = মোট সময়

(৪) **নল ও চৌবাচ্চা বিষয়ক :**

নির্দিষ্ট সময়ে চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ, $Q(t) = Q_o \pm qt$

যেখানে, Q_o = নলের মুখ খুলে দেওয়ার সময় চৌবাচ্চায় জমা পানির পরিমাণ।

q = প্রতি একক সময়ে নল দিয়ে যে পানি প্রবেশ করে অথবা বের হয়।

t = অতিক্রান্ত সময়।

$Q(t) = t$ সময়ে চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ (পানি প্রবেশ হওয়ার শর্তে '+' চিহ্ন এবং পানি বের হওয়ার শর্তে '–' চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে)।

৫। **শতকরা অংশ বিষয়ক :**

$p = br$.

যেখানে, b = মোট রাশি

r = শতকরা ভগ্নাংশ = $\frac{s}{100} = s\%$

p = শতকরা অংশ = b এর $s\%$

৬। **লাভ–ক্ষতি বিষয়ক :**

$S = C(I \pm r)$

লাভের ক্ষেত্রে, $S = C(I + r)$

ক্ষতির ক্ষেত্রে, $S = C(I - r)$

যেখানে, S = বিক্রয়মূল্য

C = ক্রয়মূল্য

I = লাভ বা মুনাফা

r = লাভ বা ক্ষতির হার

(৭) **বিনিয়োগ–মুনাফা বিষয়ক :**

সরল মুনাফার ক্ষেত্রে,

$I = Pnr$

$A = P + I = P + Pnr = P(1 + nr)$,

চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে,

$A = P(1+r)^n$

যেখানে, I = n সময় পরে মুনাফা

n = নির্দিষ্ট সময়

P = মূলধন

r = একক সময়ে একক মূলধনের মুনাফা

A = n সময় পরে মুনাফাসহ মূলধন।

উদাহরণ ১। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান করার জন্য কোনো এক সমিতির সদস্যরা 45,000 টাকার বাজেট করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রত্যেক সদস্যই সমান চাঁদা দিবেন। কিন্তু 5 জন সদস্য চাঁদা দিতে অসম্মতি জানালেন। এর ফলে প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু 15 টাকা চাঁদা বৃদ্ধি পেল। ঐ সমিতিতে কতজন সদস্য ছিলেন ?

সমাধান : মনে করি, সমিতির সদস্য সংখ্যা x এবং জনপ্রতি দেয় চাঁদার পরিমাণ q টাকা। তাহলে.

মোট চাঁদা, $A = qx$ টাকা

প্রকৃতপক্ষে সদস্য সংখ্যা ছিল $(x-5)$ জন এবং চাঁদা হলো $(q+15)$ টাকা।

তাহলে, মোট চাঁদা হলো $(x-5)(q+15)$

প্রশ্নানুসারে, $qx = (x-5)(q+15)$.....(i)

এবং $qx = 45{,}000$.....(ii)

সমীকরণ (i) থেকে পাই,

$qx = (x-5)(q+15)$

বা, $qx = qx - 5q + 15x - 75$

বা, $5q = 15x - 75 = 5(3x-15)$

$\therefore \quad q = 3x - 15$.....$(iii)$

সমীকরণ (ii) এ q এর মান বসিয়ে পাই,

$(3x-15) \times x = 45000$

বা, $3x^2 - 15x = 45000$

বা, $x^2 - 5x = 15000$ [উভয়পক্ষকে 3 দ্বারা ভাগ করে]

বা, $x^2 - 5x - 15000 = 0$

বা, $x^2 - 125x + 120x - 15000 = 0$

বা, $x(x-125) + 120(x-125) = 0$

বা, $(x-125)(x+120) = 0$

সুতরাং, $(x-125)=0$ অথবা $(x+120)=0$

বা, $x=125$ বা, $x=-120$

যেহেতু সদস্য সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই x এর মান -120 গ্রহণযোগ্য নয়।

$\therefore\ x=125$

সুতরাং, সমিতির সদস্য সংখ্যা 125

উদাহরণ ২। রফিক একটি কাজ 10 দিনে করতে পারে। শফিক ঐ কাজ 15 দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে ?

সমাধান : মনে করি, তারা একত্রে d দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে।

নাম	কাজ সম্পন্ন করার দিন	১ দিনে সম্পন্ন কাজ	d দিনে সম্পন্ন কাজ
রফিক	10	$\frac{1}{10}$	$\frac{d}{10}$
শফিক	15	$\frac{1}{15}$	$\frac{d}{15}$

প্রশ্নানুসারে, $\frac{d}{10}+\frac{d}{15}=1$

বা, $d\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\right)=1$

বা, $d\left(\frac{3+2}{30}\right)=1$

বা, $\frac{5d}{30}=1$

বা, $d=\frac{30}{5}=6$

সুতরাং, তারা একত্রে 6 দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে।

উদাহরণ ৩। একজন মাঝি স্রোতের প্রতিকূলে t_1 ঘণ্টায় x কি.মি. যেতে পারে। স্রোতের অনুকূলে ঐ পথ যেতে তার t_2 ঘণ্টা লাগে। স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগ কত ?

সমাধান : ধরি, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় v কি.মি. এবং স্থির পানিতে নৌকার বেগ ঘণ্টায় u কি.মি.।

তাহলে, স্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী বেগ ঘণ্টায় $(u+v)$ কি.মি. এবং স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার কার্যকরী বেগ ঘণ্টায় $(u-v)$ কি.মি.।

প্রশ্নানুসারে, $u+v=\frac{x}{t_2}$.....(i) [যেহেতু, বেগ = $\frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$]

এবং $u-v=\frac{x}{t_1}$.....(ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই,

$$2u=\frac{x}{t_1}+\frac{x}{t_2}=x\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)$$

বা, $u=\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)$

সমীকরণ (i) থেকে (ii) বিয়োগ করে পাই,

$$2v=x\left(\frac{1}{t_2}-\frac{1}{t_1}\right)$$

বা, $v=\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_2}-\frac{1}{t_1}\right)$

সুতরাং, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় $\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_2}-\frac{1}{t_1}\right)$ কি.মি.

এবং নৌকার বেগ ঘণ্টায় $\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)$ কি.মি.।

উদাহরণ ৪। একটি নল 12 মিনিটে একটি খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ করতে পারে। অপর একটি নল প্রতি মিনিটে 14 লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুইটি নল একসঙ্গে খুলে দেওয়া হয় এবং চৌবাচ্চাটি 96 মিনিটে পূর্ণ হয়। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে ?

সমাধান : মনে করি, প্রথম নল দ্বারা প্রতি মিনিটে x লিটার পানি প্রবেশ করে এবং চৌবাচ্চাটিতে মোট y লিটার পানি ধরে।

প্রশ্নানুসারে, প্রথম নল দ্বারা 12 মিনিটে খালি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয়

$$\therefore \quad y=12x.....(i)$$

আবার, দুইটি নল দ্বারা 96 মিনিটে খালি চৌবাচ্চা পূর্ণ হয়

$$\therefore \quad y=96x-96\times14.....(ii)$$

সমীকরণ (i) থেকে পাই, $x=\frac{y}{12}$

x এর মান সমীকরণ (ii) এ বসিয়ে পাই,

$$y=96\times\frac{y}{12}-96\times14$$

বা, $y=8y-96\times14$ বা, $7y=96\times14$

বা, $y=\frac{96\times14}{7}=192$

সুতরাং, চৌবাচ্চাটিতে মোট 192 লিটার পানি ধরে।

কাজ :

১। ক ও খ একত্রে একটি কাজ p দিনে করতে পারে। ক একা কাজটি q দিনে করতে পারে। খ একাকী কত দিনে ঐ কাজটি করতে পারবে ?

২। এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় বেয়ে ঘণ্টায় 2 কি.মি. বেগে যেতে পারে। স্রোতের বেগ ঘণ্টায় 3 কি.মি. হলে, স্রোতের অনুকূলে 32 কি.মি. যেতে তার কত সময় লাগবে ?

উদাহরণ ৫। একটি বইয়ের মূল্য 24·00 টাকা। এই মূল্য প্রকৃত মূল্যের 80%। বাকি মূল্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। সরকার প্রতি বইয়ে কত টাকা ভর্তুকি দেন ?

সমাধান : বাজার মূল্য = প্রকৃত মূল্যের 80%

আমরা জানি, $p=br$

এখানে, $p=24$ টাকা এবং $r=80\%=\frac{80}{100}$

$$\therefore\ 24=b\times\frac{80}{100}$$

বা, $b=\frac{\overset{6}{\cancel{24}}\times\overset{5}{\cancel{100}}}{\underset{4}{\cancel{80}}}$ $\therefore\ b=30$ টাকা

সুতরাং বইয়ের প্রকৃত মূল্য 30 টাকা।

$\therefore$ ভর্তুকি $= (30-24)$ টাকা

$= 6$ টাকা

সুতরাং প্রতি বইয়ে সরকার ভর্তুকি দেন 6 টাকা।

উদাহরণ ৬। টাকায় n সংখ্যক কমলা বিক্রয় করায় $r\%$ ক্ষতি হয়। $s\%$ লাভ করতে হলে, টাকায় কয়টি কমলা বিক্রয় করতে হবে ?

সমাধান : ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে, $r\%$ ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য $(100-r)$ টাকা।

তাহলে, যখন বিক্রয়মূল্য $(100-r)$ টাকা, তখন ক্রয়মূল্য 100 টাকা

$\therefore$ যখন বিক্রয়মূল্য 1 টাকা, তখন ক্রয়মূল্য $\frac{100}{100-r}$ টাকা।

আবার, ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে, $s\%$ লাভে বিক্রয়মূল্য $(100+s)$ টাকা।

$\therefore$ ক্রয়মূল্য $\frac{100}{100-r}$ টাকা হলে, $s\%$ লাভে বিক্রয়মূল্য $\left(\frac{100+s}{100}\times\frac{100}{100-r}\right)$ টাকা

$= \frac{100+s}{100-r}$ টাকা।

সুতরাং, $\frac{100+s}{100-r}$ টাকায় বিক্রয় করতে হবে n সংখ্যক কমলা

$\therefore$ 1 টাকায় বিক্রয় করতে হবে $n\times\left(\frac{100-r}{100+s}\right)$ সংখ্যক কমলা

সুতরাং, টাকায় $\frac{n(100-r)}{100+s}$ সংখ্যক কমলা বিক্রয় করতে হবে।

উদাহরণ ৭। শতকরা বার্ষিক 7 টাকা হার মুনাফায় 650 টাকার 6 বছরের মুনাফা কত ?

সমাধান : আমরা জানি, $I = Pnr$.

এখানে, $P = 650$ টাকা, $n = 6$ বছর, $s = 7$ টাকা

$\therefore \quad r = \frac{s}{100} = \frac{7}{100}$

$\therefore \quad I = 650\times 6\times\frac{7}{100} = 273$

সুতরাং, মুনাফা 273 টাকা।

উদাহরণ ৮। বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 15000 টাকার 3 বছরের সবৃদ্ধিমূল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি, $C = P(1+r)^n$ [যেখানে C চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবৃদ্ধিমূল]

দেওয়া আছে, $P = 15000$ টাকা, $r = 6\% = \frac{6}{100}$, $n = 3$ বছর

$\therefore \; C = 15000\left(1+\frac{6}{100}\right)^3 = 15000\left(1+\frac{3}{50}\right)^3$

$= 15000\left(\frac{53}{50}\right)^3$

$= 15000\times\frac{53}{50}\times\frac{53}{50}\times\frac{53}{50}$

$$= \frac{\overset{3}{\cancel{15}} \times 53 \times 53 \times 53}{\underset{25}{\cancel{125}}} = \frac{3 \times 148877}{25}$$

$$= \frac{446631}{25} = 17865 \cdot 24$$

∴ সবৃদ্ধিমূল = 17865·24 টাকা

∴ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = (17865·24 − 15000) টাকা

= 2865·24 টাকা।

কাজ :

১। বার্ষিক শতকরা $6\frac{1}{2}$ হার সরল মুনাফায় 750 টাকার 4 বছরের সবৃদ্ধিমূল কত টাকা হবে ?

২। বার্ষিক 4 টাকা হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 2000 টাকার 3 বছরের সবৃদ্ধিমূল নির্ণয় কর।

উদাহরণ ৯। $g(a) = a^3+a^2+10a-8$, $f(a) = a^3-9+(a+1)^3$এবং টাকায় 10টি দরে আইসক্রিমের কাঠি বিক্রয় করায় x% ক্ষতি হলো।

ক) g(a) কে (a-2) দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর।

খ) f(a) কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

গ) z% লাভ করতে হলে টাকায় কতটি আইসক্রিমের কাঠি বিক্রয় করতে হবে ?

সমাধান :

(ক) দেওয়া আছে,

$g(a) = a^3 + a^2 + 10a - 8$

ভাগশেষ উপপাদ্য অনুসারে g (a) কে (a − 2) দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে g (2)

∴ $g(2) = 2^3 + 2^2 + 10.2 - 8$

$= 8 + 4 + 20 - 8$

$= 32 - 8$

∴ g (2) = 24

নির্ণেয় ভাগশেষ 24.

(খ) $f(a) = a^3 - 9 + (a+1)^3$

f (a) একটি বহুপদী, এখানে a = 1 বসালে বহুপদীটির মান শূন্য হয়।

ফলে (a −1) বহুপদীটির একটি উৎপাদক।

$\therefore f(a) = a^3 - 9 + a^3 + 3a^2 + 3a + 1$

$= 2a^3 + 3a^2 + 3a - 8$

$= 2a^3 - 2a^2 + 5a^2 - 5a + 8a - 1$

$= 2a^2(a-1) + 5a(a-1) + 8(a-1)$

$= (a-1)(2a^2 + 5a + 8)$

$\therefore a^3 - 9 + (a+1)^3 = (a-1)(2a^2 + 5a + 8)$

(গ) x % ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য $= (100 - x)$

বিক্রয়মূল্য $(100 - x)$ টাকা হলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য 1 টাকা হলে ক্রয় মূল্য $\frac{100}{100-x}$ টাকা

অর্থাৎ 10টি আইসক্রিম কাঠির ক্রয়মূল্য $\frac{100}{100-x}$ টাকা

$\therefore$ 1টি আইসক্রিম কাঠির ক্রয়মূল্য $\frac{100}{(100-x)\times 10}$ টাকা

আবার z% লাভে বিক্রয় মূল্য $(100 + z)$ টাকা

ক্রয়মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য $(100 + z)$ টাকা

ক্রয়মূল্য 1 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য $\frac{(100+z)}{100}$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য $\frac{100}{(100-x)\times 10}$ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য $\frac{(100+z)}{100} \times \frac{100}{(100-x)\times 10}$ টাকা

$$= \frac{(100+z)}{(100-x)\times 10}$$

1টি আইসক্রিম কাঠির বিক্রয় মূল্য $\frac{(100+z)}{(100-x)\times 10}$ টাকা

$\therefore$ 10টি আইসক্রিম কাঠির বিক্রয় মূল্য $\frac{(100+z)}{(100-x)\times 10} \times 10$ টাকা

$$= \frac{100+z}{100-x}$$

অর্থাৎ টাকায় $\frac{100+z}{100-x}$ টি আইসক্রিম কাঠি বিক্রয় করতে হবে।

অনুশীলনী ৩·৫

১। $f(x) = x^2 - 4x + 4$ হলে, $f(2)$ এর মান নিচের কোনটি ?

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 1 (ঘ) 0

২। $\frac{1}{2}\{(a+b)^2 - (a-b)^2\}$ এর মান নিচের কোনটি ?

(ক) $2(a^2 + b^2)$ (খ) $a^2 + b^2$

(গ) $2ab$ (ঘ) $4ab$

৩। $x+\frac{2}{x}=3$ হলে, $x^3+\frac{8}{x^3}$ এর মান কত ?

(ক) 1 (খ) 8

(গ) 9 (ঘ) 16

৪। p^4+p^2+1 এর উৎপাদকে বিশ্লেষায়িত রূপ নিচের কোনটি ?

(ক) $(p^2-p+1)(p^2+p-1)$ (খ) $(p^2-p-1)(p^2+p+1)$

(গ) $(p^2+p+1)(p^2+p+1)$ (ঘ) $(p^2+p+1)(p^2-p+1)$

৫। যদি $x=2-\sqrt{3}$ হয়, তবে x^2 এর মান কত ?

(ক) 1 (খ) $7-4\sqrt{3}$

(গ) $2+\sqrt{3}$ (ঘ) $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$

৬। $f(x)=x^2-5x+6$ এবং $f(x)=0$ হলে, $x=$ কত ?

(ক) 2, 3 (খ) $-5, 1$

(গ) $-2, 3$ (ঘ) $1, -5$

৭। $9x^2+16y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ রাশি হবে ?

(ক) $6xy$ (খ) $12xy$

(গ) $24xy$ (ঘ) $144xy$

$x^4-x^2+1=0$ হলে, নিচের ৮নং–১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৮। $x^2+\frac{1}{x^2}=$ কত ?

(ক) 4 (খ) 2

(গ) 1 (ঘ) 0

৯। $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কত ?

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 1

১০। $x^3+\frac{1}{x^3}=$ কত ?

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 1 (ঘ) 0

১১। $a^2+b^2 = 9$ এবং $ab = 3$ হলে

i. $(a-b)^2 = 3$

ii. $(a+b)^2 = 15$

iii. $a^2+b^2+a^2b^2=18$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) I, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii ও iii

১২। $3a^5-6a^4+3a+14$ একটি বীজগাণিতিক রাশি হলে-

i. রাশিটির চলক a

ii. রাশিটির মাত্রা 5

iii. a^4 এর সহগ 6

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) I, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩। $p^3-\frac{1}{64}$ এর উৎপাদক-

i. $p-\frac{1}{4}$

ii. $p^2+\frac{p}{4}+\frac{1}{8}$

iii. $p^2+\frac{p}{4}+\frac{1}{16}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ)ii, iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪। ক একটি কাজ p দিনে করে এবং খ $2p$ দিনে করে। তারা একটি কাজ আরম্ভ করে এবং কয়েকদিন পর ক কাজটি অসমাপ্ত রেখে চলে গেল। বাকি কাজটুকু খ r দিনে শেষ করে। কাজটি কত দিনে শেষ হয়েছিল ?

১৫। বনভোজনে যাওয়ার জন্য 5700 টাকায় একটি বাস ভাড়া করা হলো এবং শর্ত হলো যে, প্রত্যেক যাত্রী সমান ভাড়া বহন করবে। 5 জন যাত্রী না যাওয়ায় মাথাপিছু ভাড়া 3 টাকা বৃদ্ধি পেল। বাসে কতজন যাত্রী গিয়েছিল?

১৬। একজন মাঝি স্রোতের প্রতিকূলে p ঘণ্টায় d কি.মি. যেতে পারে। স্রোতের অনুকূলে ঐ পথ যেতে তার q ঘণ্টা লাগে। স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগ কত ?

১৭। একজন মাঝির দাঁড় বেয়ে 15 কি.মি. যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে 4 ঘণ্টা সময় লাগে। সে স্রোতের অনুকূলে যতক্ষণে 5 কি.মি. যায়, স্রোতের প্রতিকূলে ততক্ষণে 3 কি.মি. যায়। দাঁড়ের বেগ ও স্রোতের বেগ নির্ণয় কর।

১৮। একটি চৌবাচ্চায় দুইটি নল সংযুক্ত আছে। প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি t_1 মিনিটে পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় নল দ্বারা t_2 মিনিটে খালি হয়। নল দুইটি একত্রে খুলে দিলে খালি চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে ?
(এখানে $t_2 > t_1$)

১৯। একটি নল দ্বারা 12 মিনিটে একটি চৌবাচ্চা পূর্ণ হয়। অপর একটি নল দ্বারা 1 মিনিটে তা থেকে 15 লিটার পানি বের করে দেয়। চৌবাচ্চাটি খালি থাকা অবস্থায় দুইটি নল একসঙ্গে খুলে দেওয়া হয় এবং চৌবাচ্চাটি 48 মিনিটে পূর্ণ হয়। চৌবাচ্চাটিতে কত লিটার পানি ধরে ?

২০। ক, খ ও গ এর মধ্যে 260 টাকা এরূপে ভাগ করে দাও যেন ক এর অংশের 2 গুণ, খ এর অংশের 3 গুণ এবং গ এর অংশের 4 গুণ পরস্পর সমান হয়।

২১। একটি দ্রব্য $x\%$ ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়া যায়, $3x\%$ লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে $18x$ টাকা বেশি পাওয়া যায়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত ছিল ?

২২। মুনাফার একই হারে 300 টাকার 4 বছরের সরল মুনাফা ও 400 টাকার 5 বছরের সরল মুনাফা একত্রে 148 টাকা হলে, শতকরা মুনাফার হার কত ?

২৩। 4% হার মুনাফায় কোনো টাকার 2 বছরের মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য 1 টাকা হলে, মূলধন কত ?

২৪। কোনো আসল 3 বছরে সরল মুনাফাসহ 460 টাকা এবং 5 বছরে সরল মুনাফাসহ 600 টাকা হলে, শতকরা মুনাফার হার কত ?

২৫। শতকরা বার্ষিক 5 টাকা হার সরল মুনাফায় কত টাকা 13 বছরে সবৃদ্ধিমূল 985 টাকা হবে ?

২৬। শতকরা বার্ষিক 5 টাকা হার মুনাফায় কত টাকা 12 বছরে সবৃদ্ধিমূল 1248 টাকা হবে ?

২৭। 5% হার মুনাফায় 8000 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় কর।

২৮। মিষ্টির উপর মূল্য সংযোজন কর $(VAT)\,x\%$। একজন বিক্রেতা ভ্যাটসহ P টাকার মিষ্টি বিক্রয় করলে তাঁকে কত ভ্যাট দিতে হবে ? $x = 15,\ P = 2300$ হলে, ভ্যাটের পরিমাণ কত ?

২৯। কোনো সংখ্যা ও ঐ সংখ্যার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার সমষ্টি 3.

ক. সংখ্যাটিকে x চলকে প্রকাশ করে উপরের তথ্যকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

খ. $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. প্রমাণ কর $x^5 + \frac{1}{x^5} = 123$

৩০। কোনো সমিতির সদস্যগণ প্রত্যেকেই সদস্যসংখ্যার 100 গুণ চাঁদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু 4 জন সদস্য চাঁদা না দেওয়ায় প্রত্যেকের চাঁদার পরিমাণ পূর্বের চেয়ে 500 টাকা বেড়ে গেল।

ক. সমিতির সদস্যসংখ্যা x এবং মোট চাঁদার পরিমাণ A হলে, এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

খ. সমিতির সদস্য সংখ্যা ও মোট চাঁদার পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ. মোট চাঁদার $\frac{1}{4}$ অংশ 5% হারে এবং অবশিষ্ট টাকা 4% হারে 2 বছরের জন্য সরল মুনাফায় বিনিয়োগ করা হলো। মোট মুনাফা নির্ণয় কর।

৩১। বনভোজনে যাওয়ার জন্য একটি বাস 2400 টাকায় ভাড়া করা হলো এবং শর্ত হলো প্রত্যেক যাত্রী সমান ভাড়া বহন করবে। 10 জন যাত্রী না আসায় মাথাপিছু ভাড়া 8 (আট) টাকা বৃদ্ধি পেল।

ক) মাথাপিছু বর্ধিত ভাড়ার পরিমান, না আসা যাত্রী সংখ্যার শতকরা কত তা নির্ণয় কর ।

খ) বাসে যাওয়া যাত্রীর মাথাপিছু ভাড়া নির্ণয় কর

গ) বাসভাড়ার সমপরিমান টাকার5% হার মুনাফায় 13 বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় কর।